



ANTEVERSIÓN FEMORAL



¿QUÉ ES?


Es una afección en la que el cuello femoral tiende a inclinarse hacia adelante con respecto al resto del fémur.




¿CÓMO SUCEDE?

Se trata de una alteración en el crecimiento que puede ser debida a problemas congénitos de la cadera, como la displasia del desarrollo de la cadera, o secundaria a deformidades plásticas de los huesos por posiciones anormales durante el crecimiento.

Suele detectarse desde los 4 a 6 años.





SIGNOS Y SÍNTOMAS


- Rotación de dedos hacia adentro
- Rodillas y pies doblados hacia adentro.
- Tendencia a tropezones o caídas.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

Acudir con un especialista, quien le realizará una valoración ortopédica integral.

Además será necesario la toma de estudios de imagen como:

- Radiografías.
- O resonancia magnética.



¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

En la mayoría de los pacientes no es necesario un tratamiento pues se trata de una afectación que mejora de forma gradual de los 8 a los 10 años de edad, y que en ocasiones suele perdurar hasta la adultez.

El tratamiento quirúrgico consiste en una osteotomía rotacional de fémur y es la opción cuando se trata de una anteversión femoral grave.