


EPIFISIOLISTESIS FEMORAL PROXIMAL



¿QUÉ ES?

Se trata de un trastorno de la cadera caracterizado por el deslizamiento de la epífisis sobre la metáfisis de la cabeza femoral en relación a la físis o cartílago de crecimiento.




¿CÓMO SUCEDE?

Suele presentarse el 80% de los casos en niños entre los 12-15 años.

Aunque su causa se considera de origen multifactorial está relacionado con factores de riesgo como:

- Obesidad
- Hipotiroidismo o trastornos endócrinos.
- Deficiencia de la hormona del crecimiento.
- Antecedentes heredofamiliares.





SIGNOS Y SÍNTOMAS


- Cojera.
- Dolor en cadera, muslo o rodilla.
- Pérdida de movimiento (rigidez)
- Acortamiento de la extremidad con rotación externa del pie.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

Acudir con un especialista, quien le realizará una valoración especializada.

Además será necesario la toma de estudios de imagen en ambas caderas como:

- Radiografías.
- Ecografía.
- O resonancia magnética.



¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

Quirúrgico: Dependerá del grado de desplazamiento y estabilidad de la cabeza femoral desde la fijación con un tornillo, o una cirugía más compleja como la reducción abierta.

